



AGRO EL NOUR MOSTA

import: EURL AGRO EL NOUR MOSTA

مستوردة من طرف أفرو النور موستا م.د.ش.و.م.م

دوار اولاد البشير رقم 12 - قسم 001 بلدية خير الدين - مستغانم - الجزائر

Douar oulad bachir N 12 - sec 001 kheir eddine mostaganem

Mobile: +213 5 58 46 41 26 - +213 5 41 84 75 85

Fax: +213 45 48 37 17 Email: agroelnourmosta@gmail.com

انفاسيت

هرمون العقد لثمار
(البندورة واللفل والباذنجان)

التركيب الكيميائي:

B- Naphthoxy Acetic Acid 8% (w/v)

Inert, solvent, surfactants95%

Total..... 100%

الخصائص:

انفاسيت:هرمون (منظم نمو) يستعمل بعد حله بالماء رشا"على أزهار البندورة واللفل والباذنجان لزيادة عقد الثمار، ومنع سقوط الأزهار وزيادة الإنتاج، وتبكير النضج، وزيادة حجم الثمار.
■ السمية: غير سام للنحل.

■ السمية على النبات: غير سام في حالة استعماله حسب الجرعة الموصى بها.

■ فترة الأمان: 15 يوم.

■ قابلية الخلط: لا تخطط مع المبيدات او الهرمونات الأخرى.

معدل الإستعمال:

- للبندورة: في الجو البارد من 4-5 سم 3 / لتر ماء، يرش على الأزهار
اما عند ارتفاع درجة الحرارة الى 25°م ترش أزهار البندورة بمعدل 3سم 3 / لتر ماء.
- يرش من 1-2 سم 3 / لتر ماء لللفل والباذنجان.

طريقة الإستعمال:

يستعمل على محاصيل البندورة واللفل والباذنجان والفراولة عندما تكون ثلثي الأزهار متفتحة، ويعاد الرش بعد 14 يوم كما ويمكن رشه على كامل المحصول بمعدل 1-2 سم 3 / لتر.

تنبيه:

على الرغم من أن المنتج قليل السمية للإنسان والحيوان، إلا أنه يجب إتخاذ الإحتياطات اللازمة بعدم استنشاق المادة.



ANFASET



AGRO EL NOUR MOSTA

import: EURL AGRO EL NOUR MOSTA

مستوردة من طرف أفرو النور موستا م.د.ش.و.م.م

دوار اولد البشير رقم 12 - قسم 001 بلدية خير الدين - مستغانم - الجزائر

Douar oulad bachir N 12 - sec 001 kheir eddine mostaganem

Mobile: +213 5 58 46 41 26 - +213 5 41 84 75 85

Fax: +213 45 48 37 17 Email: agroelnourmosta@gmail.com

Hormone de nouaison pour la tomate,
le poivron et l'aubergine

Composition chimique :

Acide β -Naphthoxyacétique (B-Naphthoxy Acetic Acid) : 8 % (p/v)

Solvants, agents tensioactifs et matières inertes : 95 %

Total : 100 %

Propriétés :

Enfaset est un régulateur de croissance végétale utilisé après dilution dans l'eau et appliqué par pulvérisation sur les fleurs de tomate, de poivron et d'aubergine. Il favorise la nouaison des fruits, réduit la chute des fleurs, augmente le rendement, accélère la maturité et améliore le calibre des fruits.

Toxicité :

Non toxique pour les abeilles.

Non phytotoxique lorsqu'il est utilisé conformément aux doses recommandées.

Délai avant récolte (DAR) : 15 jours.

Compatibilité :

Ne pas mélanger avec des pesticides ou d'autres hormones de croissance.

Dose d'application :

Tomate : Par temps froid, appliquer à raison de 4 à 5 cm³/L d'eau en pulvérisation sur les fleurs. Lorsque la température dépasse 25 °C, appliquer à raison de 3 cm³/L d'eau.

Poivron et aubergine : Appliquer à raison de 1 à 2 cm³/L d'eau.

Mode d'emploi :

Utiliser sur les cultures de tomate, poivron, aubergine et fraise lorsque les deux tiers des fleurs sont ouvertes. Renouveler l'application après 14 jours.

Il peut également être pulvérisé sur l'ensemble de la culture à raison de 1 à 2 cm³/L d'eau.

Précautions :

Bien que le produit présente une faible toxicité pour l'homme et les animaux, il est recommandé de prendre les précautions nécessaires et d'éviter l'inhalation du produit lors de son utilisation.

